

Sorkkaterveystilasto 2025




faba

Uudistunut sorkkaterveystilasto

Nykyään noin 95 % sorkkahoitotiedoista tallennetaan SorkkaMobiililla sorkkahoitajien tai karjanomistajien toimesta. SorkkaMobiililla on mahdollista tallentaa **erikseen lievä ja vakava muoto kolmesta eri sorkkasairaudesta** (vertymiä anturassa, anturahaavauma ja kantasyöpymä). Nämä on nyt eroteltu myös sorkkaterveystilastossa. Lisäksi on tarkennettu ja yhtenäistetty muiden pohjoismaiden kanssa määritelmä siitä, milloin sairaus on uusi tapaus. **Sairaus käsitetään nyt uudeksi silloin, kun edellisestä saman sairauden tallentamisesta on yli 4 kk aikaa.** Aiemmin laskettiin mukaan kaikki hoitokoodit ajankohdasta huolimatta. Muutos vaikuttaa hieman vertailtavuuteen aiempien vuosien kanssa mutta toisaalta saamme nyt **täsmällisempää tietoa maan sorkkaterveystilanteesta.** Muutos sairauksien esiintyvyydessä uuden ja vanhan tilastointitavan välillä on hyvin pieni (viimeinen sivu). Ainoa poikkeus on ontuminen, jota tallennetaan muilla tallennustavoilla kuin SorkkaMobiililla eli karjanomistajien toimesta joko Nasevaan tai Minun Maatilaani huomattavan paljon, varmasti muulloinkin kuin sorkkahoidon yhteydessä. **Tässä tilastossa sairauksien esiintyvyyksien laskemiseen on käytetty SorkkaMobiililla tallennettuja sorkkahoitotietoja vuodelta 2025.** Sorkkahoitotietojen kokonaismäärän ja hoidettujen eläinten määrän laskemiseen on käytetty lisäksi muilla tavoilla (Minun Maatilani ja Naseva) tallennettuja sorkkahoitotietoja.




6 yleisintä sorkkasairautta lypsyroduittain 2025



Mukana sorkkahoitajien ja karjanomistajien SorkkaMobiililla tallentamat tiedot. Kunkin sairauden lukumäärää on verrattu vuoden aikana hoitotelineessä käyneiden eläinten määrään. Sama eläin on voitu sorkkahoitaa vuoden aikana useammin kuin yhden kerran.


Sorkkahoitotietojen kokonaismäärä 2012 – 2025



Sama eläin on voitu sorkkahoitaa useamman kerran saman vuoden aikana. Mukana myös lihakarjarodut.



Vähintään kerran vuoden aikana hoidettujen lypsylehmien osuus koko lypsylehmämäärästä 2012 – 2025



Sorkkasairauksien esiintyvyys sorkkahoidetuilla eläimillä 2025

| | | Koodi / Code | Määrä (kpl) /Number of cases | % hoidetuista / % of trimmed |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Valkoviivan repeämä | White line fissure | 763 | 29433 | 10,0 % |
| Vertymiä anturassa, yht. | Sole haemorrhage, total | 761 | 19660 | 6,7 % |
| <i>Vertymiä anturassa, lievä</i> | <i>Sole haemorrhage, mild</i> | 761 | 15291 | 5,2 % |
| <i>Vertymiä anturassa, vakava</i> | <i>Sole haemorrhage, severe</i> | 761 | 4369 | 1,5 % |
| Kantasyöpymä, yht. | Heel horn erosion, total | 766 | 16515 | 5,6 % |
| <i>Kantasyöpymä, lievä</i> | <i>Heel horn erosion, mild</i> | 766 | 11718 | 4,0 % |
| <i>Kantasyöpymä, vakava</i> | <i>Heel horn erosion, severe</i> | 766 | 4797 | 1,6 % |
| Kierresorkka | Corkscrew claw | 768 | 12999 | 4,4 % |
| Anturahaavauma, yht. | Sole ulcer, total | 764 | 12895 | 4,4 % |
| <i>Anturahaavauma, lievä</i> | <i>Sole ulcer, mild</i> | 764 | 8005 | 2,7 % |
| <i>Anturahaavauma, vakava</i> | <i>Sole ulcer, severe</i> | 764 | 4890 | 1,7 % |
| Kaksoispohja | Double sole | 772 | 10809 | 3,7 % |
| Sorkkavälin liikakasvu | Interdigital hyperplasia/ Interdigital fibroma | 775 | 6244 | 2,1 % |
| Sorkka-alueen ihotulehdus, DD | Digital dermatitis | 767 | 5915 | 2,0 % |
| Lievä ihotulehdus (sorkkavälin ihotulehdus) | Mild dermatitis | 765 | 3654 | 1,2 % |
| Valkoviivan paise | White line abscess/ White line ulcer | 773 | 3154 | 1,1 % |
| Sorkkasyylä / Krooninen DD | Chronic dermatitis/ Wart growth | 777 | 975 | 0,3 % |
| Ontuminen | Lameness | 779 | 964 | 0,3 % |
| Vamma | Trauma | 785 | 930 | 0,3 % |
| Sisäpinnan halkeama | Axial fissure | 782 | 841 | 0,3 % |
| Ohut pohja | Thin sole | 781 | 747 | 0,3 % |
| Kärkipaise | Toe ulcer/ Toe abscess/ Toe necrosis | 771 | 391 | 0,1 % |
| Ylikasvaneet sorkat | Overgrown claws | 776 | 338 | 0,1 % |
| Epäsymmetriset sorkat | Asymmetric claws/ Different sized claws | 774 | 283 | 0,1 % |
| Sorkkavälin ajotulehdus | Interdigital phlegmon/ Foul in the foot/ Foot rot | 770 | 273 | 0,1 % |
| Krooninen sorkkakuume / Poikittaishalkeama | Chronic laminitis/ Laminitic ring/ Horizontal fissure | 762 | 229 | 0,1 % |
| Saksisorkat | Scissor claws | 778 | 90 | 0,0 % |
| Pitkäittäishalkeama | Vertical horn fissure | 783 | 41 | 0,0 % |

Sorkka- sairauksien esiintyvyys lypsy- roduittain 2025

| Sairaus | Koodi | Holstein | | Ayrshire | | Suomenkarja | | Jersey | |
|--|-------|----------|----------------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Määrä | % hoidetui sta | Määrä | % hoidetui sta | Määrä | % hoidetui sta | Määrä | % hoidetui sta |
| Valkoviivan repeämä | 763 | 21520 | 10,5 % | 7209 | 8,9 % | 110 | 5,6 % | 220 | 7,7 % |
| Vertymiä anturassa, yht. | 761 | 14781 | 7,2 % | 4502 | 5,5 % | 68 | 3,5 % | 144 | 5,0 % |
| Vertymiä anturassa, lievä | 761 | 11450 | 5,6 % | 3578 | 4,4 % | 58 | 3,0 % | 96 | 3,4 % |
| Vertymiä anturassa, vakava | 761 | 3331 | 1,6 % | 924 | 1,1 % | 10 | 0,5 % | 48 | 1,7 % |
| Kantasyöpymä, yht. | 766 | 12195 | 5,9 % | 4021 | 4,9 % | 29 | 1,5 % | 104 | 3,6 % |
| Kantasyöpymä, lievä | 766 | 8282 | 4,0 % | 3202 | 3,9 % | 26 | 1,3 % | 91 | 3,2 % |
| Kantasyöpymä, vakava | 766 | 3913 | 1,9 % | 819 | 1,0 % | 3 | 0,2 % | 13 | 0,5 % |
| Anturahaavauma, yht. | 764 | 10071 | 4,9 % | 2467 | 3,0 % | 49 | 2,5 % | 138 | 4,8 % |
| Anturahaavauma, lievä | 764 | 6133 | 3,0 % | 1658 | 2,0 % | 38 | 2,0 % | 83 | 2,9 % |
| Anturahaavauma, vakava | 764 | 3938 | 1,9 % | 809 | 1,0 % | 11 | 0,6 % | 55 | 1,9 % |
| Kaksoispohja | 772 | 8038 | 3,9 % | 2508 | 3,1 % | 32 | 1,6 % | 83 | 2,9 % |
| Kierresorkka | 768 | 7782 | 3,8 % | 4869 | 6,0 % | 36 | 1,8 % | 116 | 4,1 % |
| Sorkkavälin liikakasvu | 775 | 5187 | 2,5 % | 961 | 1,2 % | 10 | 0,5 % | 20 | 0,7 % |
| Sorkka-alueen ihotulehdus, DD | 767 | 5066 | 2,5 % | 679 | 0,8 % | 13 | 0,7 % | 63 | 2,2 % |
| Lievä ihotulehdus (sorkkavälin ihotulehdus) | 765 | 2890 | 1,4 % | 710 | 0,9 % | 9 | 0,5 % | 29 | 1,0 % |
| Valkoviivan paise | 773 | 2422 | 1,2 % | 669 | 0,8 % | 6 | 0,3 % | 17 | 0,6 % |
| Sorkkasyylä / Krooninen DD | 777 | 774 | 0,4 % | 185 | 0,2 % | 2 | 0,1 % | 6 | 0,2 % |
| Ontuminen | 779 | 705 | 0,3 % | 234 | 0,3 % | | 0,0 % | 12 | 0,4 % |
| Sisäpinnan halkeama | 782 | 704 | 0,3 % | 120 | 0,1 % | 4 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
| Vamma | 785 | 676 | 0,3 % | 228 | 0,3 % | 5 | 0,3 % | 10 | 0,4 % |
| Ohut pohja | 781 | 628 | 0,3 % | 100 | 0,1 % | 5 | 0,3 % | 7 | 0,2 % |
| Kärkipaise | 771 | 309 | 0,2 % | 71 | 0,1 % | | 0,0 % | 6 | 0,2 % |
| Epäsymmetriset sorkat | 774 | 185 | 0,1 % | 84 | 0,1 % | | 0,0 % | 10 | 0,4 % |
| Sorkkavälin ajotulehdus | 770 | 177 | 0,1 % | 78 | 0,1 % | 5 | 0,3 % | 10 | 0,4 % |
| Ylikasvaneet sorkat | 776 | 159 | 0,1 % | 157 | 0,2 % | 4 | 0,2 % | 14 | 0,5 % |
| Krooninen sorkkakuume | 762 | 109 | 0,1 % | 114 | 0,1 % | | 0,0 % | 3 | 0,1 % |
| Saksisorkat | 778 | 54 | 0,0 % | 34 | 0,0 % | | 0,0 % | | 0,0 % |
| Pitkäikäishalkeama | 783 | 34 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | | 0,0 % | | 0,0 % |

Sorkkasairauksien esiintyvyys liharoduittain 2025

| Sairaus | Koodi | Hereford | | Simmental | | Limousin | | Aberdeen Angus | | Charolais | | Blonde d'Aquitaine | |
|---|-------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| | | Määrä | % hoidetuis ta | Määrä | % hoidetuis ta | Määrä | % hoidetuis ta | Määrä | % hoidetuis ta | Määrä | % hoidetuis ta | Määrä | % hoidetuis ta |
| Valkoviivan repeämä | 763 | 175 | 15,4 % | 275 | 26,9 % | 176 | 20,3 % | 127 | 16,7 % | 125 | 16,4 % | 35 | 4,6 % |
| Vertymiä anturassa, yht. | 761 | 60 | 5,3 % | 105 | 10,3 % | 57 | 6,6 % | 32 | 4,2 % | 30 | 3,9 % | 4 | 0,5 % |
| Vertymiä anturassa, lievä | 761 | 41 | 3,6 % | 58 | 5,7 % | 44 | 5,1 % | 17 | 2,2 % | 23 | 3,0 % | 3 | 0,4 % |
| Vertymiä anturassa, vakava | 761 | 19 | 1,7 % | 47 | 4,6 % | 13 | 1,5 % | 15 | 2,0 % | 7 | 0,9 % | 1 | 0,1 % |
| Kierresorkka | 768 | 59 | 5,2 % | 91 | 8,9 % | 81 | 9,4 % | 77 | 10,1 % | 72 | 9,5 % | 14 | 1,8 % |
| Kaksoispohja | 772 | 44 | 3,9 % | 91 | 8,9 % | 68 | 7,9 % | 41 | 5,4 % | 46 | 6,0 % | 7 | 0,9 % |
| Anturahaavauma, yht. | 764 | 28 | 2,5 % | 33 | 3,2 % | 23 | 2,7 % | 39 | 5,1 % | 44 | 5,8 % | 13 | 1,7 % |
| Anturahaavauma, lievä | 764 | 17 | 1,5 % | 21 | 2,1 % | 13 | 1,5 % | 19 | 2,5 % | 24 | 3,2 % | 6 | 0,8 % |
| Anturahaavauma, vakava | 764 | 11 | 1,0 % | 12 | 1,2 % | 10 | 1,2 % | 20 | 2,6 % | 20 | 2,6 % | 7 | 0,9 % |
| Valkoviivan paise | 773 | 24 | 2,1 % | 46 | 4,5 % | 14 | 1,6 % | 20 | 2,6 % | 19 | 2,5 % | 7 | 0,9 % |
| Sorkkavälin liikakasvu | 775 | 21 | 1,8 % | 14 | 1,4 % | 1 | 0,1 % | 18 | 2,4 % | 5 | 0,7 % | 6 | 0,8 % |
| Pitkäittäishalkeama | 783 | 13 | 1,1 % | 7 | 0,7 % | 12 | 1,4 % | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % | 8 | 1,1 % |
| Vamma | 785 | 13 | 1,1 % | 11 | 1,1 % | 8 | 0,9 % | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Kantasyöpymä, yht. | 766 | 7 | 0,6 % | 8 | 0,8 % | 13 | 1,5 % | 23 | 3,0 % | 9 | 1,2 % | 4 | 0,5 % |
| Kantasyöpymä, lievä | 766 | 6 | 0,5 % | 5 | 0,5 % | 12 | 1,4 % | 19 | 2,5 % | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
| Kantasyöpymä, vakava | 766 | 1 | 0,1 % | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| Ontuminen | 779 | 5 | 0,4 % | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % | 8 | 1,1 % | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Krooninen sorkkakuume | 762 | 3 | 0,3 % | | 0,0 % | | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 7 | 0,9 % | | 0,0 % |
| Lievä ihotulehdus (sorkkavälin ihotulehdus) | 765 | 3 | 0,3 % | 6 | 0,6 % | | 0,0 % | 7 | 0,9 % | | 0,0 % | | 0,0 % |
| Sorkka-alueen ihotulehdus, DD | 767 | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | 3 | 0,4 % | | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| Sorkkavälin ajotulehdus | 770 | 3 | 0,3 % | 8 | 0,8 % | | 0,0 % | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | | 0,0 % |
| Kärkipaise | 771 | 3 | 0,3 % | 6 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | | 0,0 % |
| Epäsymmetriset sorkat | 774 | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % | 5 | 0,6 % | 8 | 1,1 % | | 0,0 % | | 0,0 % |
| Sisäpinnan halkeama | 782 | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % | | 0,0 % | 2 | 0,3 % | | 0,0 % | | 0,0 % |
| Ylikasvaneet sorkat | 776 | 2 | 0,2 % | 6 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | | 0,0 % |
| Saksisorkat | 778 | 1 | 0,1 % | 3 | 0,3 % | | 0,0 % | | 0,0 % | 1 | 0,1 % | | 0,0 % |
| Sorkkasyylä / Krooninen DD | 777 | | 0,0 % | 1 | 0,1 % | | 0,0 % | | 0,0 % | | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| Ohut pohja | 781 | | 0,0 % | 5 | 0,5 % | | 0,0 % | | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| Ennaltaehkäisevä sorkkahoito | 822 | 1138 | | 1023 | | 865 | | 761 | | 557 | | 259 | |

Uuden ja vanhan
tilastointitavan
vertailu

| | | UUSI TILASTOINTITAPA | | | VANHA TILASTOINTITAPA | | |
|---|-----|----------------------|---|--|-----------------------|---|--|
| | | Määrä (kpl) | Sairauksien määrä suhteessa hoidettujen määrään | Sairauksien määrä suhteessa lypsylehmien määrään | Määrä (kpl) | Sairauksien määrä suhteessa hoidettujen määrään | Sairauksien määrä suhteessa lypsylehmien määrään |
| Vertymiä anturassa, yht. | 761 | 19660 | 6,7 % | 8,7 % | 19911 | 6,5 % | 8,8 % |
| <i>Lievä</i> | | 15291 | 5,2 % | 6,7 % | | | |
| <i>Vakava</i> | | 4369 | 1,5 % | 1,9 % | | | |
| Krooninen sorkkakuume | 762 | 229 | 0,1 % | 0,1 % | 237 | 0,1 % | 0,1 % |
| Valkoviivan repeämä | 763 | 29433 | 10,0 % | 13,0 % | 31546 | 10,3 % | 13,9 % |
| Anturahaavauma, yht. | 764 | 12895 | 4,4 % | 5,7 % | 13178 | 4,3 % | 5,8 % |
| <i>Lievä</i> | | 8005 | 2,7 % | 3,5 % | | | |
| <i>Vakava</i> | | 4890 | 1,7 % | 2,2 % | | | |
| Lievä ihotulehdus (sorkkavälin ihotulehdus) | 765 | 3654 | 1,2 % | 1,6 % | 3848 | 1,3 % | 1,7 % |
| Kantasyöpymä, yht. | 766 | 16515 | 5,6 % | 7,3 % | 17230 | 5,6 % | 7,6 % |
| <i>Lievä</i> | | 11718 | 4,0 % | 5,2 % | | | |
| <i>Vakava</i> | | 4797 | 1,6 % | 2,1 % | | | |
| Sorkka-alueen ihotulehdus, DD | 767 | 5915 | 2,0 % | 2,6 % | 6444 | 2,1 % | 2,8 % |
| Kierresorkka | 768 | 12999 | 4,4 % | 5,7 % | 14101 | 4,6 % | 6,2 % |
| <i>Muu sorkkasairaus</i> | 769 | | | | 154 | 0,1 % | 0,1 % |
| Sorkkavälin ajotulehdus | 770 | 273 | 0,1 % | 0,1 % | 696 | 0,2 % | 0,3 % |
| Kärkipaise | 771 | 391 | 0,1 % | 0,2 % | 491 | 0,2 % | 0,2 % |
| Kaksoispohja | 772 | 10809 | 3,7 % | 4,8 % | 11149 | 3,6 % | 4,9 % |
| Valkoviivan paise | 773 | 3154 | 1,1 % | 1,4 % | 3402 | 1,1 % | 1,5 % |
| Epäsymmetriset sorkat | 774 | 283 | 0,1 % | 0,1 % | 328 | 0,1 % | 0,1 % |
| Sorkkavälin liikakasvu | 775 | 6244 | 2,1 % | 2,7 % | 7115 | 2,3 % | 3,1 % |
| Ylikasvaneet sorkat | 776 | 338 | 0,1 % | 0,1 % | 451 | 0,1 % | 0,2 % |
| Sorkkasyylä / Krooninen DD | 777 | 975 | 0,3 % | 0,4 % | 1059 | 0,3 % | 0,5 % |
| Saksisorkat | 778 | 90 | 0,0 % | 0,0 % | 94 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Ontuminen</i> | 779 | 964 | 0,3 % | 0,4 % | 7042 | 2,3 % | 3,1 % |
| <i>Kinnerhiertymä</i> | 780 | | | | 35 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Ohut pohja</i> | 781 | 747 | 0,3 % | 0,3 % | 923 | 0,3 % | 0,4 % |
| <i>Sisäpinnan halkeama</i> | 782 | 841 | 0,3 % | 0,4 % | 907 | 0,3 % | 0,4 % |
| <i>Pitkäittäishalkeama</i> | 783 | 41 | 0,0 % | 0,0 % | 42 | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Vamma</i> | 785 | 930 | 0,3 % | 0,4 % | 1054 | 0,3 % | 0,5 % |
| Ennaltaehkäisevä sorkkahoito | 822 | 294650 | | | 307561 | | |

